



Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Chemii

WRZEŚNIOWA DIAGNOZA MATURALNA Z CHEMII

Poziom rozszerzony

Data: wrzesień 2026

Czas pracy: 180 minut

Liczba punktów do uzyskania: 60


Instrukcja dla zdającego:

1. Sprawdź, czy arkusz maturalny zawiera 26 stron (zadania 1.–26.).
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Możesz korzystać z tablic *Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzaminie maturalnym z biologii, chemii i fizyki*, linijki oraz kalkulatora naukowego.
8. Znajdujący się obok kod QR poprowadzi Cię do strony, na której znajdziesz:
 - a. **modele odpowiedzi do tego arkusza**,
 - b. **omówienia wideo tego arkusza**.Oba materiały będą dostępne od czwartku 1.10.2026 r. od godziny 19:00.
9. Jeśli masz pytania odnoszące się do tego arkusza możesz je przysyłać na adres matura.chemia@chemia.uj.edu.pl.



Zadanie 1.

Poniżej przedstawiono graficzny zapis konfiguracji elektronowych atomów czterech pierwiastków chemicznych oznaczonych numerami I-IV.



Zadanie 1.1. (0-1)

Określ przynależność wszystkich pierwiastków oznaczonych numerami I-IV do bloków konfiguracyjnych (s, p, d) układu okresowego. Uzupełnij tabelę – w odpowiednich kolumnach wpisz numery, którymi oznaczono te pierwiastki.

Symbol bloku konfiguracyjnego	s	p	d
Numer pierwiastka			


Zadanie 1.2. (0-1)

Uzupełnij tabelę. Napisz numery (I-IV), którymi oznaczono wszystkie pierwiastki spełniające warunek określony w danym wierszu tabeli.

Pierwiastek, dla którego zaprezentowano konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym.	
Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma co najmniej jeden elektron walencyjny opisywany następującymi wartościami liczb kwantowych: $n = 4$, $l = 0$.	

Zadanie 2. (0-1)

Na rysunku pokazano kontury dwóch orbitali atomowych należących do powłoki elektronowej M.



Uzupełnij poniższe zdania dotyczące orbitali pokazanych na rysunku.

Wartość głównej liczby kwantowej n , która opisuje każdy z przedstawionych orbitali, wynosi

Przedstawione orbitale różnią się wartością liczby kwantowej oznaczanej symbolem

Zadanie 3. (0-1)


Na rysunku obok przedstawiono model kulkowo-prętowy anionu tiosiarczanowego $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Orbitale walencyjne atomu centralnego w anionie tiosiarczanowym

znajdują się w stanie hybrydyzacji (sp / sp^2 / sp^3),

a kąt S–S–O przyjmuje wartość ok. (105° / 109° / 120°).



Zadanie 4. (0-2)

W pewnym tlenowym kwasie monofosforowym, masa fosforu stanowi 47 % masy całego związku. W cząsteczce tego kwasu występuje tylko jedno wiązanie O–H.


Na podstawie obliczeń ustal i napisz wzór sumaryczny opisanego kwasu. Następnie narysuj jego wzór elektronowy. Zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.

Wzór sumaryczny kwasu:

Wzór elektronowy:


Zadanie 5. (0-1)

Uzupełnij poniższy rysunek tak, aby obrazował opisane oddziaływania jonów z cząsteczkami wody. Wpisz w puste miejsca wzory odpowiednich jonów.




Zadanie 6. (0-2)

Poniżej przedstawiono w postaci skróconej przebieg pewnej reakcji jądrowej, której produktem jest atom tlenu ^{16}O .

[illegible]

Zadanie 7. (0-1)


Polon-218 ulega samorzutnej przemianie zgodnie z równaniem:



Czas półtrwania izotopu polonu-218 wynosi 185,9 s, a zależność szybkości opisanej przemiany od liczby jąder polonu-218 opisuje poniższe równanie kinetyczne:

$$v = k \cdot N_{\text{Po}}^a$$

W reaktorze umieszczono próbkę zawierającą $9 \cdot 10^{11}$ jąder polonu-218. Na wykresie przedstawiono zależność szybkości rozpadu promieniotwórczego od procentowego ubytku liczby jąder polonu-218 w próbce, względem początkowej liczby jąder.



Na podstawie wykresu ustal i napisz wartość wykładnika a w równaniu kinetycznym.

$a = \dots\dots\dots$

Zadanie 8. (0-1)


Szereg promieniotwórczy to ciąg kolejnych przemian niestabilnych jąder atomowych, które przekształcają się w inne jądra. W szeregu torowym, rozpoczynającym się od nuklidu ^{232}Th i kończącym się trwałym nuklidem ^{208}Pb , zachodzą wyłącznie rozpady α oraz β^- .

Uzupełnij tabelę. Wpisz liczbę rozpadów α oraz β^- zachodzących w szeregu torowym.

Liczba przemian α	Liczba przemian β^-

Zadanie 9.

Tiosiarczan sodu można otrzymać m.in. w czasie ogrzewania siarki w stężonym roztworze wodorotlenku sodu. Reakcja ta przebiega zgodnie ze schematem:




Zadanie 9.1. (0-1)

Uzupełnij schemat. Wpisz liczby moli elektronów:


- pobieranych przez siarkę w czasie tworzenia 1 mola anionów siarczkowych,
- oddawanych przez siarkę podczas tworzenia 1 mola anionów tiosiarczanowych.

Wskazane wartości zapisz z odpowiednim znakiem (+ albo -).




Zadanie 9.2. (0-1)

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.



Zadanie 10.

Fosforowodór w warunkach normalnych występuje w gazowym stanie skupienia. Ochładzany pod ciśnieniem 1013 hPa skrapla się w temperaturze ok. $-88\text{ }^{\circ}\text{C}$, a zestala w temperaturze ok. $-133\text{ }^{\circ}\text{C}$. Na rysunku przedstawiono model kulkowy fosforowodoru oraz innej cząsteczki substancji X. Modele odzwierciedlają zależności pomiędzy rozmiarami poszczególnych atomów.



fosforowódór

substancja X

Zadanie 10.1. (0-1)

Rozstrzygnij, czy substancją X jest selenowódór czy woda. Uzasadnij odpowiedź.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

.....

.....

.....

Zadanie 10.2. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

W wyniku zestalenia fosforowodoru w temperaturze ok. $-133\text{ }^{\circ}\text{C}$ otrzymuje się substancję krystaliczną o budowie (kowalencyjnej / molekularnej). W tej postaci fosforowódór jest (izolatorem / przewodnikiem) prądu elektrycznego.

Zadanie 12.

Do zlewki zawierającej wodę destylowaną z dodatkiem alkoholowego roztworu fenoloftaleiny wprowadzono niewielki kawałek metalu M, co pokazano na zdjęciu.

Zadanie 12.1. (0-1)

Rozstrzygnij, czy metalem M w opisanym doświadczeniu był bar czy sód. Uzasadnij odpowiedź.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

.....

.....

.....

.....



Zadanie 12.2. (0-1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Reakcja zachodząca w opisanym doświadczeniu spowodowała wzrost pH roztworu w zlewce.	P	F
2.	W doświadczeniu wydzielą się gaz podtrzymujący spalanie.	P	F

Zadanie 14.

Pewien metal M ulega utlenieniu, tworząc dwudodatnie jony proste. Kationy te mogą stanowić jony centralne w związkach kompleksowych o liczbie koordynacyjnej równej 4.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do probówki z wodnym roztworem soli $M(NO_3)_2$ (zdjęcie 1.), wprowadzano kroplami rozcieńczony wodny roztwór wodorotlenku sodu. Po kilku pierwszych kroplach zawartość probówki wyglądała tak, jak to pokazano na zdjęciu 2. Kolejne krople spowodowały, że zawartość probówki przyjęła postać taką, jak pokazano na zdjęciu 3.



Zadanie 14.1. (0-1)

Na podstawie opisu doświadczenia określ charakter chemiczny (amfoteryczny, kwasowy, obojętny, zasadowy) wodorotlenku metalu M.

Zadanie 14.2. (0-1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji roztwarzania osadu, która ma miejsce w czasie przebiegu opisanego doświadczenia.

Zadanie 14.3. (0-1)

Do roztworu soli metalu M, który pokazano na zdjęciu 1. w informacji wstępnej, wprowadzono uniwersalny papierek wskaźnikowy. Papierek ten po wyjęciu z probówki wyglądał tak, jak na zdjęciu obok.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji wyjaśniającej odczyn tego roztworu.



Zadanie 15.

Do roztworu soli metalu Z, pokazanego na zdjęciu 1., wprowadzono pył metalu X. Po pewnym czasie odsączono ciało stałe, a roztwór wyglądał tak, jak pokazano na zdjęciu 2.



Zadanie 15.1. (0-1)

Rozstrzygnij, któremu z metali – X czy Z – odpowiada półogniwo Me^{n+}/Me o wyższym potencjale redukcji. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

.....

.....

.....

Zadanie 15.2. (0-1)


Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Solą metalu Z zastosowaną w doświadczeniu mógł być (AgNO_3 / CrCl_3 / CuSO_4 / FeCl_2).

Z kolei metalem X mógł być (Ag / Cr / Cu / Zn).

Zadanie 16. (0-2)

Skonstruowano ogniwo, którego budowę przedstawia schemat:




Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w tym ogniwie i oblicz jego siłę elektromotoryczną w warunkach standardowych.

Równanie:

SEM:

Zadanie 17. (0-1)

Połączono dwa standardowe półogniwa, tworząc ogniwo pokazane na poniższym rysunku.



Zastosowany w ogniwie klucz elektrolityczny był wypełniony nasyconym roztworem azotanu(V) potasu.

Rozstrzygnij, czy w czasie pracy opisanego ogniwa stężenie jonów azotanowych(V) w roztworze katodowym maleje, rośnie czy nie ulega zmianie. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:


.....

.....

.....

Zadanie 18.

Rdzewienie jest procesem korozji elementów stalowych i żelaznych. W początkowym etapie korozji żelaza zachodzi przemiana opisana poniższym równaniem:



Powstający wodorotlenek żelaza(II) pod wpływem tlenu atmosferycznego utlenia się do wodorotlenku żelaza(III), który z kolei ulega rozkładowi z wydzielaniem uwodnionego tlenku żelaza(III) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.

Przeprowadzono szkolny eksperyment, w którym gwóźdź stalowy umieszczono na kilka tygodni w probówce zawierającej wodę wodociągową. Po zakończeniu doświadczenia zawartość probówki wyglądała tak, jak to pokazano na zdjęciu.



Zadanie 18.1. (0-1)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie procesu utlenienia wodorotlenku żelaza(II) do wodorotlenku żelaza(III), które ma miejsce w procesie rdzewienia.

Zadanie 18.2. (0-1)

Z probówki pokazanej na zdjęciu wyciągnięto gwóźdź i dodano do niej niewielką porcję rozcieńzonego kwasu solnego. Spowodowało to rozтворzenie osadu i powstanie klarownego roztworu.

Napisz wzór jonów odpowiadających za barwę wodnej mieszaniny po zakończeniu opisanego doświadczenia.

Zadanie 18.3. (0-1)

Spośród poniższych propozycji zaznacz te, których zastosowanie spowodowałoby, że proces korozji w opisanym doświadczeniu przebiegałby z mniejszą intensywnością.

- Umieszczenie gwoźdźcia w roztworze wodnym o $\text{pH}=5$ zamiast w wodzie wodociągowej.
- Ograniczenie dostępu tlenu do probówki, w której prowadzono doświadczenie.
- Wprowadzenie do wody wodociągowej, przed umieszczeniem w niej gwoźdźcia, kilku kropli wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu $0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.


Zadanie 19. (0-3)

Oblicz minimalną objętość wody potrzebną do całkowitego rozpuszczenia próbki fosforanu(V) magnezu o masie 1,31 mg w temperaturze 25 °C. Użyj wartości mas molowych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wynik końcowy napisz w cm^3 w zaokrągleniu do jedności.



Zadanie 20. (0-4)

Poniższe zdjęcia, ustawione w przypadkowej kolejności, pokazują wygląd probówek podczas doświadczenia, w którym badano właściwości związków chromu.



a) **Uzupełnij opis doświadczenia. Wpisz we właściwe miejsca odpowiedni numer zdjęcia.**

W jednej probówce przygotowano wodny roztwór chlorku chromu(III) i dodawano do niego wodny roztwór wodorotlenku potasu obserwując wytrącenie osadu, a następnie jego całkowite rozтворzenie.

Po tej operacji zawartość probówki wyglądała tak, jak pokazano na zdjęciu

W drugiej probówce przygotowano wodny roztwór nadtlenu wodoru (zdjęcie).

Zawartość obu probówek wymieszano i ogrzano w łaźni wodnej. Po zakończeniu ogrzewania zawartość probówki wyglądała tak, jak pokazano na zdjęciu


b) **Napisz w formie jonowej skróconej równania strącania i roztworzenia osadu wskazane w opisie doświadczenia.**

Strącanie osadu:

Roztworzenie osadu:


c) W roztworze chlorku chromu(III), przed wprowadzeniem wodorotlenku potasu, znajdowały się m. in. jednododatnie jony kompleksowe, których liczba koordynacyjna była równa 6.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby powstał wzór opisanego jonu.



Zadanie 21.

Poniżej przedstawiono modele przestrzenne sześciu związków organicznych A–F, zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru oraz – w przypadku niektórych – również atomów tlenu.



Zadanie 21.1. (0-1)

Wskaż oznaczenia wszystkich związków, które w warunkach normalnych są gazami.

Zadanie 21.2. (0-1)

Wskaż oznaczenia wszystkich związków, które wprowadzone do wodnego roztworu bromu powodują jego natychmiastowe odbarwienie.

Zadanie 21.3. (0-1)

Wskaż oznaczenia wszystkich związków, których cząsteczki mogą łączyć się ze sobą wiązaniami wodorowymi.


Zadanie 21.4. (0-1)

Izomery to związki o tym samym wzorze sumarycznym, ale odmiennej budowie.

Wskaż oznaczenia dwóch związków, które są względem siebie izomerami.

Zadanie 22. (0-1)


W roztworach wodnych formaldehyd, czyli metanal, ulega odwracalnej reakcji addycji wody, w wyniku czego powstaje metanodiol.




Przemiana ta w rzeczywistości jest wieloetapowa, a szczegółowy opis kolejności, w jakiej w jej przebiegu pękają i tworzą się wiązania chemiczne, nosi nazwę mechanizmu reakcji.

Poniżej przedstawiono mechanizm addycji wody do metanalu.


Etap 1.



Etap 2.



Etap 3.



W chemii organicznej nukleofile są zasadami Lewisa (donorami par elektronowych), natomiast elektrofile – kwasami Lewisa (akceptorami par elektronowych).

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Cząsteczka formaldehydu w etapie 1. pełni rolę (elektrofila / nukleofila).

Cząsteczka wody w etapie 2. jest (akceptorem / donorem) jonu H^+ .



Zadanie 23.

Polimeryzacja addycyjna (łańcuchowa) jest jednym ze sposobów otrzymywania związków wielkocząsteczkowych. W jej przebiegu kolejne cząsteczki monomeru przyłączają się do aktywnego centrum rosnącego łańcucha polimerowego, powodując jego wydłużanie. Charakterystyczną cechą polimeryzacji łańcuchowej jest brak produktów ubocznych o małej masie cząsteczkowej.

Zadanie 23.1. (0-1)


Jednym z polimerów najpowszechniej wykorzystywanych we współczesnym świecie jest poli(chlorek winylu), czyli polichloroeten. Stosuje się go np. w produkcji ram okien.

Narysuj wzór strukturalny związku będącego monomerem w procesie polimeryzacji prowadzącej do otrzymania poli(chlorku winylu).



Zadanie 23.2. (0-1)

W wodnych roztworach formaldehydu związek ten, oprócz odwracalnej reakcji addycji wody, może ulegać również spontanicznej polimeryzacji jak to pokazano na schemacie.



Szybkość tego procesu zależy od stężenia formaldehydu oraz temperatury. W celu zapobiegania spontanicznej polimeryzacji komercyjnie dostępne roztwory formaldehydu zawierają dodatki inhibitora tego procesu – metanolu.

Rozstrzygnij, czy przedstawiony proces polimeryzacji jest reakcją typu redoks. Uzasadnij odpowiedź.

Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

.....

.....

Zadanie 24.

Kwas cytrynowy należy do grupy wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów – w jego cząsteczce znajduje się grupa hydroksylowa i trzy grupy karboksylowe. Kwas ten ulega trójetapowej dysocjacji elektrolitycznej z odszczepieniem jonów wodoru od grup karboksylowych. Wartości pK_a kolejnych etapów dysocjacji wynoszą: $pK_{a1} = 3,13$; $pK_{a2} = 4,76$; $pK_{a3} = 6,40$. Największą zdolność do deprotonacji wykazuje grupa karboksylowa przyłączona do atomu węgla, którego formalny stopień utlenienia wynosi +I.



Zadanie 24.1. (0-1)

Uzupełnij tabelę. Wpisz liczbę wiązań typu σ (sigma) oraz typu π (pi) w cząsteczce kwasu cytrynowego.

Liczba wiązań typu σ	Liczba wiązań typu π

Zadanie 24.2. (0-1)

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) dominującej w roztworze wodnym formy dwuujemnego anionu kwasu cytrynowego.

Zadanie 24.3. (0-2)

[illegible]This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Zadanie 25.

Białko jaja kurzego to mieszanina wody i wielu białek. Na załączonej fotografii przedstawiono jajko ugotowane na miękko, czyli do momentu ścięcia białka jaja, przy jednoczesnym zachowaniu płynności żółtka.

Zadanie 25.1. (0-1)

Spośród poniższych stwierdzeń wybierz i zaznacz wszystkie te, które są prawdziwe.

- W wyniku gotowania białka uległy denaturacji.
- W wyniku gotowania białka uległy wysoleniu.
- W wyniku gotowania białka uległy koagulacji.
- W czasie gotowania uległy zmianom II- i III-rzędowe struktury białek.
- Gotowanie jajka spowodowało hydrolizę wiązań peptydowych i rozpad łańcucha polipeptydowego na aminokwasy.



Zadanie 25.2. (0-1)


Dokończ poniższe zdanie tak, aby było prawdziwe.

Po wodzie, która jest głównym składnikiem żółtka jaja kurzego,

w największej ilości występują w nim

Zadanie 26.

Na rysunku przedstawiono wzory cyklicznych form (tzw. projekcje Hawortha) trzech cukrów – fruktozy (A), glukozy (B) oraz sacharozy (C).



Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Zadanie 26.2. (0-1)

Na podstawie obliczeń ustal, czy cukrem poddanym spalaniu była glukoza czy sacharoza.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 26.3. (0-1)

Przygotowano wodny roztwór fruktozy o stężeniu $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a następnie zbadano jego odczyn za pomocą papierka uniwersalnego.


Spośród poniższych zdjęć wybierz i zaznacz to, na którym przedstawiono wygląd probówki zawierającej wodny roztwór fruktozy po zanurzeniu w nim uniwersalnego papierka wskaźnikowego.



Zadanie 26.4. (0-1)

Glukoza, ze względu na obecność grup hydroksylowych w cząsteczce, może w odpowiednich warunkach ulegać estryfikacji. Produktem reakcji tego cukru z kwasem octowym w stosunku molowym 1 : 5 jest pentaocetan glukozy (penta-O-acetylogluchoza).

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby powstał wzór pentaocetanu tej formy glukozy, która jest przedstawiona w informacji wstępnej.



(brudnopis)